

本情報は箱に表示されております。

ご使用前に、この説明文（外箱に表示）をよくお読み下さい。
また、必要な時に読めるように保管して下さい。

平成21年3月作成

第2類医薬品

イチジク浣腸 楽おし

特徴

楽に押せる／液残りが少ない



使用上の注意



してはいけないこと

連用しないで下さい。

（常用すると、効果が減弱し（いわゆる“なれ”が生じ）薬剤にたよりがちになります。）



相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師等に相談して下さい。
 - 医師の治療を受けている人。
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人。
（流産の危険性があるので使用しないことが望ましい。）
 - 高齢者及び身体が極度に弱っている人。
 - はげしい腹痛、悪心・嘔吐、痔出血のある人。
 - 心臓病の診断を受けた人、腸の手術を受けた人又は排便直後の人。
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師等に相談して下さい。
 - 発疹等があらわれた場合。
 - 2～3回使用しても排便がない場合。

その他の注意

たちくらみ、肛門部の熱感、腹痛、不快感、残便感等があらわれることがあります。

効能・効果

便秘

用法・用量

12歳以上 1回1個(30g)を直腸内に注入して下さい。


それで効果のみられない場合には、さらに同量をもう一度注入して下さい。

【用法・用量に関連する注意】

- 用法・用量を厳守して下さい。
- 本剤使用後は、便意が強まるまで、しばらくがまんして下さい。
（使用後すぐに排便を試みると薬剤のみ排出され、効果がみられないことがあります。）

- (3) 12歳未満の小児には、使用させないで下さい。
- (4) 無理に挿入すると、直腸粘膜を傷つけるおそれがあるので注意して下さい。
- (5) 冬季は容器を温湯(40℃位)に入れ、体温近くまで温めると快適に使用できます。
- (6) 洗腸にのみ使用して下さい。(内服しないで下さい。)

【使い方】



- ノズルを真上に向け、薬液を少し押し出し、先端周囲をぬらすと挿入しやすくなります。

成分・分量

本品 1 個(30g)中 日局グリセリン……………15. 00g

添加物…ベンザルコニウム塩化物含有。 溶剤…精製水使用。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】 30g×2コ入り 30g×10コ入り

お問い合わせ先

イチジク製薬株式会社 お客様相談室

電話番号： 03-3624-6101(代表)

受付時間： 9時～17時 (土、日、祝日を除く)

製造販売元

イチジク製薬株式会社

(日本製)

東京都墨田区東駒形4-16-6

(独) 医薬品医療機器総合機構
副作用救済制度
☎ 0120-149-931